

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

FLEXISEQ[®]

(Sequessome Tehnoloogiat[®] sisaldav geel)

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
• Küsimustega korral pöörduge arsti või apteekri poole.

1. Koostis

Aqua, Phosphatidylcholine, Alcohol, Glycerin, Carbomer, Polysorbate 80, Disodium Phosphate, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Ethylparaben, Linalool, Disodium EDTA, Sodium Phosphate, Sodium Metabisulfite, BHT.

2. Väljanägemine ja pakendi sisu

- Flexiseq on valge või kollakas geel 50-grammises tuubis.

3. Ettenähtud kasutus

- Flexiseq määrib liigestevahelist kõhre, et vähendada valu ja jäikust ning parandada halvenenud liigesetalistust, mida seostatakse osteoartriidi kõkide etappidega.

4. Ettevaatusabinõud ja turvameetmed

- Hoida lastele kättesaamatust kohas.

4.1 Ärge kasutage Flexiseq'i...

- kui olete allergiline (ülitundlik) Flexiseq'i mõne koostisosaga suhtes.
- lahtistel haavadel, katkisel või pöletikulisel nahal või limaskestadel (kehaöönsuste, nagu suu, nina või silmade ääred).

4.2 Rasedus ja imetamine

- Flexiseq'i pole klinilistes uuringutes rasedate naiste peal testitud ja seega pole geeli kasutamine raseduse ajal soovitatav, välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab.
- Ei ole teada, kas Flexiseq on imetamise ajal lapsele ohtlik. Enne toote kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrit.

4.3 Kasutamine lastel

- Flexiseq'i pole veel laste peal testitud. Lastel kasutamisel küsida nõu arstilt.

5. Kuidas Flexiseq'i kasutada

- Flexiseq on mõeldud ainult välispidiseks kasutuseks, vältige kontakti silmadega. Kui toode satub silma, loputage koheselt puhta veega.
- Kui arst pole soovitanud teisiti, kasutage kaks korda päevas, hommikul ja öhtul liigest ümbritseval alal. Kandke peale vastavale liigesele sobiv kogus geeli:
 - põle, õla või puusa korral nimetissõrme-pikkune joon.
 - hüppelilgese, randme või ühe käe sõrmede korral poolne nimetissõrme pikkune joon.
- Tähtis on leida sobiv kogus määritava liigeseta jooksu.
- Pärast geeli kasutamist peske käsi.
- Enne määritud koha kinnikatmist tuleb sel lasta kuivada. Selle tegematajätmine vähendab toote efektiivsust.
- Laske pealekantud Flexiseq geeli enne kinnikatmist vähemalt 10 minutit kuivada või kuni määritud piirkond on puudutamisel kuiv.
- Kui geeli kulub kuivamiseks kauem kui 10 minutit, siis kasutatisite liiga palju geeli ja peaksite järgmine kord vähem kasutama.
- Kui kuivamiseks kulub vähem kui 10 minutit, peaksite järgmine kord kasutama rohkem geeli.
- Kuivamisaja vähendamiseks:
 - soojendage enne geeli kasutamist nahka.
 - võtke pärast määrimist kasutada fõoni keskmisel temperatuuriastmel, et vähendada kuivamisaega umbes 2 minutille.
- Flexiseq'i kasutamine kaks korda päevas võib leevendada valu juba 2 päevaga. Täieliku mõju ilmнемiseks võib aga kuluda mitu päeva toote pidevat kasutamist.
- Pärast avamist säilitada temperatuuril 8°C kuni 25°C ja kasutada kolme kuu jooksul.



Pange geeli ühtlaselt ümber ligese.




Määrite geeli liigese ees- ja tagaküljel ühtlaselt laialt (ärge määrite põlvekedrale).



Laske Flexiseq geeli 10 minutit enne kinnikatmist kuivada.

6. Võimalikud kõrvaltoimed

- Flexiseq'iga seoses ei ole tösiselid kõrvaltoimeid teada.
- Klinilistes testides põhjustas Flexiseq kasutuskohas kergeid nahaäritusi, nagu erüteemi, kuivust ja lõövet. Need olid tavaiselt leebi kuni keskmise intensiivsusega, lühiajalisel ja moõdusid iseenesest. Ravisekkumine polnud vajalik.
- Kõrvaltoimed, mis puudutavad nahka ja nahalauskudet (pehmelt kudet kasutuspunktona naha all) võivad ilmneda umbes kaks nädalat pärast geeli kasutamise alustamist, kuid peaksid kaduma iseenesest, kui te toote kasutamist jätkate. Püsivate kõrvaltoimate tekkimisel vähendage annust (nt üks kord päevas kahe korra asemel). Kui see ei aita, siis lopetage toote kasutamine, kuni probleem laheneb, milleks võib kuluda mitu päeva. Naha paranemise järel võite hakata toodet uesti kasutama, kui puuduvad töendid allergilisest reaktsioonist.
- Kui ükskoik milline kõrvaltoimetest muutub tösiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
- Koostoimeid ravimitega pole teada.



- Temperatuuripiirang (säilitada temperatuuril 8°C kuni 25°C)

• Hoiatus

• Järgige kasutusjuhiseid



• Tarvitada enne (KK.AAAA). Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja loppu (vt märgistust tuubil ja karbil)



• Partii number (vt märgistust tuubil ja karbil)



• Tootja
MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg

- Flexiseq[®] ja Sequessome Technology[®] on Pro Bono Bio[®] kaubamärgid.

Juuni 2014

03/05/001

Pro Bono Bio[®]

03/05/001

CE 0499

Pro Bono Bio[®]

CE 0499